



Přípravek Pure whitening je určen k bělení zubů.

Bělení zubů má následující kontraindikace:

- těhotenství
- kojení

Vedlejší účinky:

- během bělení se může vyskytnout přechodná zvýšená citlivost zubů
- během bělení se mohou přechodně zvýraznit bělavé skvrny na zubech, po ukončení bělení se barva opět sjednotí

Citlivost je možné snížit používáním zubních past obsahujících dusičnan draselný (například Sensodyne Pronamel). Doporučujeme začít takovou pastu používat nejméně jeden týden před započatím samotného bělení.

Domácí fáze kombinovaného bělení trvá běžně 14 nocí, po ní následuje ordinační bělení. Po ordinačním bělení je třeba ještě 2-5 dní pokračovat v domácí fázi. Ve výjimečných případech (rezistentní diskolorace, fluoróza, zuby postižené tetracyklinem apod.) je potřeba pro dosažení optimálního výsledku (Vita B1) domácí fázi prodloužit.

Během bělení není potřeba dodržovat striktní bílou dietu, přesto je dobré si po konzumaci výrazně barevných jídel a nápojů vyčistit zuby.

Kouření může mít negativní vliv na délku bělení a je někdy potřeba pokračovat po ordinačním bělení v domácím bělení dalších 14 nocí pro dosažení optimálního výsledku (Vita B1). U parodontologických pacientů s výraznými recesy lze očekávat, vzhledem k vyššímu vystavení gelů účinku slin, delší průběh a horší výsledek (ne vždy se podaří dosáhnout B1).

Gely odpovídají Evropské směrnici 2011/84/EU.

Potvrzuji, že jsem byl informován o kontraindikacích a možných vedlejších účincích bělení zubů Pure whitening.

Jméno pacienta:

Datum:

Podpis: